

体内式ペースメーカー電池交換パス入院

患者 様 歳
 主治医

治療日：平成 年 月 日
 ペースメーカー設定 (モード)
 (レート)

パスは、ガイドラインです。患者には個人差があり、治療・回復にも影響します。

					入院・PMI前日		手術当日				術後1日目				術後2日目					
					月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日		
バイタル	T	P	R	BP																
	41	170		200																
	40	150		150																
	39	130	30	100																
	38	110	25	50																
	37	90	20																	
	36	70	15																	
	35	50	10																	
尿・便回数																				
胸部症状																				
創痛																				
創部発赤																				
創部腫脹																				
創部出血																				
治療・処置					血圧測定1検 抗血小板剤・抗凝固剤中止() パンスポリンテスト()				糖尿病治療薬の減量・休薬() パンスポリンBS1g(D) フォール留置(有 無) ソリタT3 500ml(Rt Lt) パンスポリンBS1g(F)				抗血小板剤・抗凝固剤内服開始() パンスポリンBS1g(D) パンスポリンBS1g(F)				パンスポリンBS1g(D) パンスポリンBS1g(F)			
インスリン()					□11:30	□17:30	□21:00	□7:00	□11:30	□17:30	□21:00	□7:00	□11:30	□17:30	□21:00	□7:00	□11:30	□17:30	□21:00	
検査					便ヘモ1回(/) 心電図				血液検査											
					胸部レントゲン2方向 UCG				PMI後胸部レントゲン											
					PMI後直後ECG															
安静度					院内フリー				PMI後棟内フリー				院内フリー							
説明・指導					PMIオリエンテーション				PMIのインフォームドコンセント(AM)											
清潔					入浴可				PMI前入浴可				全身清拭							
食事・水分					E- 塩分 g 飲水制限なし				昼食止め PMI後飲水可、検査後食・夕食可											
臨時処置																				
アウトカム					1ペースメーカー電池交換に対する理解がされている。				2疼痛がコントロールされている 3創部の異常がない 4感染の徴候がない				2疼痛がコントロールされている 3創部の異常がない 4感染の徴候がない							
看護特記事項																				
ヴァリアンス					有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	
ヴァリアンスコード																				
サイン					D	F	A	D	F	A	D	F	A	D	F	A	D	F		

内服薬
裏面に記載

ヴァリアンスの記載について
 ・軽度のときは赤で書き込む
 ・中等度のときは赤で書き込みヴァリアンス記載欄にも記載する。
 ・重大なときは「看護特記事項」にも記載しパスを終了し、看護記録に移す。
 ・CP使用できない場合は、医師の指示のもと看護記録へ移行する。
 ・アウトカム評価は術当日のみF勤それ以外はD勤で評価する。
 ・に達成、変動
 逸脱 ×で記入する。

書き方約束
 ・にレでチェックする。
 ・胸部症状～創部出血までの項目は、なし:- あり:+とし、ありの場合は看護特記事項にも記入する。

体内式ペースメーカー電池交換パス入院

患者 _____ 様

					術後3日目			術後4日目			術後5日目			術後6日目						
					月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日				
バイタル	T	P	R	BP																
	41	170		200																
	40	150		150																
	39	130	30	100																
	38	110	25	50																
	37	90	20																	
	36	70	15																	
35	50	10																		
尿・使用回数																				
胸部症状																				
創痛																				
創部発赤																				
創部腫脹																				
創部出血																				
治療・処置					パンスポリンBS1g(D) パンスポリンBS1g(F)			パンスポリンBS1g(D) パンスポリンBS1g(F)			抗生剤内服() (/ ~ /) 抜鉤・シルキーポア貼用			シルキーポア除去						
インスリン()					□7:00	□11:30	□17:30	□21:00	□7:00	□11:30	□17:30	□21:00	□7:00	□11:30	□17:30	□21:00	□7:00	□11:30	□17:30	□21:00
検査					血液検査 胸部レントゲン2方向						ホルターECG									
安静度																				
説明・指導																				
清潔					全身清拭			シャワー浴可												
食事・水分																				
臨時処置																				
アウトカム					2疼痛がコントロールされている 3創部の異常がない 4感染の徴候がない			2疼痛がコントロールされている 3創部の異常がない 4感染の徴候がない			2疼痛がコントロールされている 3創部の異常がない 4感染の徴候がない			2疼痛がコントロールされている 3創部の異常がない 4感染の徴候がない						
看護特記事項																				
ヴァリアンス					有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無
ヴァリアンスコード																				
サイン					A	D	F		A	D	F		A	D	F		A	D	F	

体内式ペースメーカー電池交換パス入院

患者 _____ 様

					術後7日目			退院			退院			退院			
					月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	
バイタル	T	P	R	BP													
	41	170		200													
	40	150		150													
	39	130	30	100													
	38	110	25	50													
	37	90	20														
	36	70	15														
35	50	10															
尿・使用回数																	
胸部症状																	
創痛																	
創部発赤																	
創部腫脹																	
創部出血																	
治療・処置																	
インスリン()					□7:00	□11:30	□17:30	□21:00	□7:00	□11:30	□17:30	□21:00	□7:00	□11:30	□17:30	□21:00	
検査																	
安静度																	
説明・指導									インフォームドコンセント			インフォームドコンセント			インフォームドコンセント		
清潔					入浴可												
食事・水分																	
臨時処置																	
アウトカム					2疼痛がコントロールされている 3創部の異常がない 4感染の徴候がない			2疼痛がコントロールされている 3創部の異常がない 4感染の徴候がない			2疼痛がコントロールされている 3創部の異常がない 4感染の徴候がない			2疼痛がコントロールされている 3創部の異常がない 4感染の徴候がない			
看護特記事項																	
ヴァリアンス					有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
ヴァリアンスコード																	
サイン					A	D	F	A	D	F	A	D	F	A	D	F	

ペースメーカー電池交換パス入院指示箋

- 氏名 _____ 殿 歳 男・女
- 1) 食事 _____ Kcal・塩分 _____ g 飲水制限なし
- 2) 身長・体重測定・血圧測定 1日 1検・蓄尿不要
- 3) 処方 特別に指示なければ抗血小板剤・抗凝固剤すべて中止
他の外来薬はすべて内服継続
インスリン _____
- 4) 入院 1日目 院内フリー・入浴可
手術前日 便ヘモ 1回・胸部レントゲン 2方向・心電図・UCG
パンスポリンテスト施行
- 5) 入院 2日目 PMI 前 院内フリー・入浴可
手術当日 血液検査 (ラベル裏面貼付)
パンスポリンBS 1g 1日2回 DIV
午前中 PMI のインフォームド・コンセント
昼食止め
糖尿病治療薬の減量あるいは休薬 _____
導尿バルーン留置 (要・不要・本人の希望)
ソリタ T3 500ml ルートキープ (Rt or Lt)
手術部位; Rt or Lt
抗生剤散布 要 パンスポリン 1g + NS 20ml
創部 デュオアクティブ ET 貼付
手術終了後 胸部レントゲン
ソリタ T3 残 DIV 終了後抜針
PMI 後 棟内フリー・入浴不可・清拭のみ可
夕食摂取可
- 6) 入院 3日目 院内フリー・入浴不可・清拭のみ可
術後1日目 パンスポリンBS 1g 1日2回 DIV
抗血小板剤・抗凝固剤内服再開
- 7) 入院 4日目 パンスポリンBS 1g 1日2回 DIV
術後2日目

- 8) 入院 5日目 パンスポリンBS 1g 1日2回 DIV
 術後3日目 血液検査 (ラベル裏面貼付)・胸部レントゲン2方向
- 9) 入院 6日目 シャワー可
 術後4日目 パンスポリンBS 1g 1日2回 DIV
- 10) 入院 7日目 抗生剤内服 _____ / _____ ~ _____ / _____
 術後5日目 抜鉤・シルキーポア貼付
 ホルターECG
- 11) 入院 8日目 シルキーポア除去
 術後6日目
- 12) 入院 9日目 入浴可
 術後7日目
- 13) 入院 10日目以降 インフォームド・コンセント後退院

年 月 日 医師

看護師

ペースメーカー電池交換

	入院当日	手術当日	手術当日	術後1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目
検査	心電図	血液検査				血液検査				あと一歩です！	退院となります
	胸部レントゲン					胸部レントゲン					
検査	心エコー	レントゲン室へ						24時間の心電図をおこないます			
処置		点滴を開始します						抜糸をします	創の確認をします		
点滴		抗生物質の点滴を朝・夕に行ないます	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	抗生物質の内服が始まります			
内服											
食事	カロリー 塩分 g	昼食は絶食となります	手術後は 飲水可から治療食へ	普通の食事に 戻ります							
安制度	安静度自由	安静度自由	棟内フリー 歩行可	院内フリー 安静度自由			院内フリー				
説明・指導	入院時説明を いたします	手術の時説明が あります								退院指導	医師から退院について 説明があります
清潔	入浴可		清拭	清拭	清拭	清拭	創部をカバーして シャワー可	創部をカバーして シャワー可	創部をカバーして シャワー可	入浴可	入浴可