

函館五稜郭病院CKD病診薬連携
の運用を開始しました

-CKDシールによる腎機能情報共有-

 <p>CKD (透析) (糖尿病) 函館五稜郭病院</p>	患者名
	血清Cr 1.55 mg/dl
	eGFR 27.5 mL/min/1.73m ²
	検査日 2017年3月1日

この用紙は再度、お薬手帳の最新頁に挟み、患者さんに御返却下さい

■ 目的

函館五稜郭病院は、CKD（慢性腎臓病）患者さんの医薬品適正使用を目的に、医師、薬剤師の連携によるCKD病診薬連携の運用を2017年5月から開始しました。

■ 対象患者さん

当院腎臓内科医がCKD診断した患者さんへ、シールについて説明し同意を得て、お薬手帳の表紙に「CKDシール」を貼付しております。患者さんへの説明用紙は裏面をご参照ください。

■ CKDシール記載内容

CKDの診断、透析治療の有無、糖尿病治療の有無、シール貼付日の直近検査値の血清クレアチニン値(Cr)(mg/dL)、eGFR(mL/min/1.73m²)、検査日を記載しています。

■ ご使用方法(当院ホームページの「CKD病診薬連携」参照。腎機能評価、特に注意する薬剤を掲載) 腎機能に応じた腎排泄型薬剤の投与設計及び薬剤性腎障害防止を目的に、診療・検査・処方、薬剤師による処方監査・調剤・服薬指導にぜひご活用下さい。

■ CKDシールの更新時期、更新方法

当院ホームページの「CKD病診薬連携」をご覧ください。透析、糖尿病治療中の場合、上記見本を基にCKDシール赤枠内に「透析」「糖尿病」と記載して下さい。

■ 更新用CKDシールの取得方法(3通り)

①本紙裏面に添付した更新用シールを使用します ②当院ホームページからもCKDシールの印刷が可能です ③当薬剤科へご連絡下さい。なお、貼付されたCKDシールを重ねて貼付します。詳細は当院ホームページの「CKD病診薬連携」をご覧ください。

■ 更新時の腎機能検査値の取得方法

- ・当院通院患者の場合 | 患者さんからの検査値情報提供による更新をお願い致します。また検査値情報提供等が無い場合、下記へ問い合わせにて直近検査値情報を提供致します(薬剤科Tel 0138-51-2295 内線6207)
- ・当院非通院患者の場合 | 貴施設にて定期的な腎機能検査の実施、また患者さんからの検査値情報提供による更新をお願い致します。

■ CKDシールに関するお問い合わせは、下記担当者までご連絡ください

函館五稜郭病院 薬剤科 矢羽羽 (やはば) Tel 0138-51-2295 内線6207

CKD



患者名
血清Cr mg/dl
eGFR mL/min/1.73m²
検査日 年 月 日

函館五稜郭病院

CKD



患者名
血清Cr mg/dl
eGFR mL/min/1.73m²
検査日 年 月 日

函館五稜郭病院

CKD



患者名
血清Cr mg/dl
eGFR mL/min/1.73m²
検査日 年 月 日

函館五稜郭病院

CKD




患者名
血清Cr mg/dl
eGFR mL/min/1.73m²
検査日 年 月 日

函館五稜郭病院

患者さん説明用紙

お薬手帳へ貼るCKDシール

慢性腎臓病（CKD）になると、腎臓の働きが悪くなります。薬は体から出ていきにくく薬の影響を受けやすくなり、状態に合わせて薬の種類や量を変更する場合があります。安全に患者さんに薬を服用して頂くために医師、薬剤師は腎機能を確認する必要があります。腎機能を表す指標のひとつとしてeGFRがあります。血清Cr値、糖尿病、透析治療も重要な情報です。



当院腎臓内科医がCKDと診断した患者さんへ、医師、薬剤師、看護師がお薬手帳の表紙にCKDシールを貼ります



CKD



患者名
血清Cr 1.55 mg/dl
eGFR 27.5 mL/min/1.73m²
検査日 2017年2月1日

透析治療中 | 透析記載
糖尿病治療中 | 糖尿病記載

CKDシールで出来ること

- ① 患者さんのCKD情報(eGFR等)を医師や薬局・病院の薬剤師が共有することで、医師・薬剤師が連携し最適な薬物療法を提供することができます。
- ② 医師や薬剤師にお薬手帳を見せ、自分がCKDであることを簡単に伝えることができます。
- ③ 災害や救急時、医師や薬剤師は患者さんの腎機能情報を把握できます。

腎機能の程度	eGFR(mL/min/1.73m ²)
G1 正常または高値	≥90
G2 正常または軽度低下	60~89
G3a 軽度~中等度低下	45~59
G3b 中等度~高度低下	30~44
G4 高度低下	15~29
G5 末期腎不全	<15

CKD診療ガイド2012



お薬手帳を常備し、診察時や薬局に処方箋を提出する時、必ず医師、薬剤師にお薬手帳を見せてください

ご質問など、詳細につきましては当院腎臓内科医師、薬剤師、担当看護師までお問い合わせ下さい

社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 腎臓内科、薬剤科、看護部

更新用CKDシール

CKDシールは重ねて貼付します。

透析、糖尿病治療中の場合、右記を参照し赤枠内に「透析」「糖尿病」の記載をお願い致します

腎排泄型薬剤は、腎機能に応じて減量や投与間隔の延長が必要となる場合があります、注意が必要です

略号	検査項目名	基準値(当院)	単位	項目説明
血清Cr	血清クレアチン	男性：0.61~1.04 女性：0.47~0.79	mg/dL	腎機能の指標。高値であるほど腎機能が低下していることを表しています。
eGFR	推算糸球体濾過値	-	mL/min/ 1.73m ²	血清クレアチン値と年齢と性別から算出される腎機能の指標。低値であるほど腎機能が低下していることを示します(患者説明用紙参照)。体表面積1.73m ² あたりの値で表示されます。